

Résultats

Objectif principal: **Taux de survie PTH**

N at risk	Année	Révision	Taux de survie (Kaplan-Meier)
42	0-1	1	97.6%

92,9% à 6 mois !

1 révision : Fracture en per-op

Objectifs secondaires:

Satisfaction patients : 90,5% sont satisfaits de la chirurgie à 6 mois !

Harris Hip Score

	Moyenne ± STD (Range)
HHS Préop	57.7 ± 30.24 (53.5) [1:9] (n=38)
HHS Post-Op	93.03 ± 6.28 (94) [71 : 100] (n=30)

Reverse Oxford Score

	Moyenne ± STD (Range)
OHS inversé Préop	38,66 ± 18.84 (44) [12 ; 96] (n=38)
OHS inversé Post-op 6 mois	14.64 ± 3.39 (14) [12 ; 28] (n=12)

Parker Score

	Moyenne ± STD (Range)
Reversed OHS Préop	6,47 ± 2,33 (6) [2 ; 9] (n=51)
Reversed OHS Post-op 6 mois	8,48 ± 1,25 (8.5) [4 ; 9] (n=27)

Activité Devane

	Devane
Préop	Sédentaire (9.4%) – Semi-sédentaire (43.8%) – Activité légère (36.6%) – Activité modéré (12.5%) - Activité Lourde (3.1%)
Suivi 6 mois	Sédentaire (4.9%) – Semi-sédentaire (48.8%) – Activité légère (36.6%) – Activité modéré (9.8%)

Note: L'étude a été clôturée prématurément le 24/11/2025 pour un manque d'inclusion ne permettant pas d'atteindre l'objectif de l'étude.